

تجربة (7)

تخمين ارتفاع خلط الملوثات ليلاً ونهاراً

هدف التجربة: تحديد وحساب ارتفاع خلط الملوثات (ارتفاع الطبقة المحاددة) خلال دورة يوم كامل باستخدام تسجيلات جهاز الراديو سوند خلال الليل المظلم.

الجزء النظري

يعرّف ارتفاع الخلط (H_m) Mixing height على انه ارتفاع الطبقة المجاورة والملاصقة مع سطح الارض التي يحدث خلالها خلط للملوثات او اية مكونات سواء كانت منبعثة او مسحوبة اليها وعليه فان الملوثات تنتشر عمودياً بواسطة الاضطراب المحلي او الميكانيكي خلال تدرج زمني حوالي ساعة واحدة [4].

يبلغ ارتفاع الطبقة المحاددة (h) Boundary layer ما بين 500 m و 3000 m وتقسّم الى طبقة سطحية (تبلغ 10% من ارتفاع الطبقة المحاددة وتكون القرب الى سطح الارض) وطبقة حملية متعادلة التي تسمى بالطبقة المختلطة عند قمة الطبقة المختلطة نجد طبقة الانقلاب، بعد هذه الطبقة يصبح الجو حاراً كما موضح بالشكل (11-3).

ويسبب ان سطح الارض تتغير درجة حرارتها اسرع من الهواء، لذا فانها تؤثر فجأة على الهواء الذي يعلوها فعليه درجة حرارته في الطبقة السطحية سيمتلك انحدارات مختلفة عن معدل الانحدار الاديبياتيكي الجاف، لذلك فان انحدارات درجة الحرارة العمودية ستكون مختلفة خلال النهار والليل والتي ستؤثر على استقرارية الطبقة. حيث تصبح الطبقة السطحية والجزء الكبير من الطبقة المختلطة في الليل مستقرة عندما تتزايد درجة الحرارة مع الارتفاع بسبب التبريد الاشعاعي للارض.


عند قمة الطبقة المحاددة انحدار درجة الحرارة عادة موجب (يعني مستقر) ويكون الاضطراب حامل وهذه هي طبقة انقلاب التي من الصعوبة النفاذ خلالها لذا تعتبر بمثابة سقفا للتلوث لهذا فان معظم التلوث المنبعث عند مستوى سطح الارض سينتشر تقريبا نحو الاعلى لغاية 3 km من الغلاف الجوي مع تشتت اضافي الى التروبوسفير الحر كونها عملية بطيئة.

عند وقت الليل المتأخر والصبح الباكر حيث يكون هناك اوقات متنوعة بعد شروق الشمس وممكن توضيح ارتفاع الخلط في الشكل (11-3). منحني A يبين الحالة المستقرة عند الظلام

والجو المستقرة خلال وقت الليل مع عدم حدوث خلط. عند تسخين الارض بسبب الاشعاع الشمسي فان المقطع العمودي يصبح مثل منحنى B بحيث يكون ارتفاع الخلط صغير كان 100 m، خلال هذا الارتفاع يحدث الاضطراب والخلط. وعند تقدم واستمرار الوقت يزداد ارتفاع الخلط نتيجة تكوين الطبقة الغير مستقرة قرب الارض التي تصبح اكثر سمكاً. وعند منتصف النهار او وقت العصر يصل ارتفاع الخلط طبقة الانقلاب للطبقة المحايدة الجوية كما مبين في الشكل (11-3) ثم يبدأ بالتناقص عند غياب الشمس ويرجع اصغر ما يمكن عند الظلام الدامس وهذا الشكل ايضاً يوضح طريقة تخمين حساب H_m عند اوقات مختلفة بدأً من الصباح الباكر وبقية اوقات اليوم الواحد مع ملاحظة زيادة ارتفاع الخلط مع الوقت.

المواد والادوات المستخدمة

1. مخطط T-Ø فارغ.
2. بيانات درجات الحرارة لارتفاعات مختلفة مأخوذة من تسجيلات الراديو سوند لوقت 0000 GMT لمحطة مطار بغداد الدولي، الموضحة بالجدول (4-3).
3. بيانات درجات الحرارة السطحية لاربع اوقات رصد رئيسية لنفس المحطة اعلاه والتاريخ الشكل (6-2).
4. مساطر قياس.



الشكل (3-11): يبيّن تغيّار درجة الحرارة مع الارتفاع خلال النهار والليل مع تحديد ارتفاع الخلط.

جدول (3-4): بيانات درجات حرارة الهواء المحيطية مع الارتفاع.

2.2	2.0	1.8	1.5	1.2	1	0.8	0.6	0.4	0.2	0.01	Z (km)
-3	-1	0.4	1.2	1.8	2.1	2.4	3.1	4.3	3.5	3.0	T (°C)

طريقة العمل

1. ثبت قيم جهاز الراديو سوند اي قيم درجات الحرارة وفقا للارتفاعات المناظرة لهم على منحنى T-Ø مؤشراً بنقاط غامقة لجميع النقاط.
2. صل بين القيم بخطوط متصلة وبذلك تحصل على منحنى درجة الحرارة البيئية.

3. على محور السينات الذي هو محور درجات الحرارة ومن ارتفاع الصفر ثبت قيم درجات الحرارة حسب الاوقات.

4. من قيمة كل درجة الحرارة السطحية اصعد مع خط الاديبيات الجافة (معدل الانحدار الاديبياتيكي الجاف) الى ان يقطع منحنى درجة الحرارة البيئي.

5. من نقطة التقاطع تحرك نحو المحور الصادي (محور الارتفاع) افقياً الى ان يقطع المحور وحدد قيمة الارتفاع الذي يمثل ارتفاع الخلط (ارتفاع الطبقة المحاددة)، H_m .

6. سجّل قيم ارتفاع الخلط في الجدول ادناه.


00	18	12	00	الاوراق (GMT)
5	18	25	6	T (°C)
				H_m (m)

7. ارسم العلاقة البيانية بين الاوقات الزمنية على محور السينات وقيم H_m على محور الصادات ثم ارسم افضل خط بياني.

المناقشة

س1: ناقش علاقة ارتفاع الخلط مع اوقات الرصد خصوصاً بعد شروق الشمس؟

الجواب:-----



س2: اشرح ومن خلال نتائجك مدى تأثير درجات الحرارة على صعود او هبوط قيم ارتفاع

الخط؟

الجواب:-----

.---

س3: وضّح العلاقة بين انحدارات درجات الحرارة مع الاستقرارية الجوية ومن ثم مع قيم

ارتفاعات الخط؟

الجواب:-----

.---

س4: ماذا تتوقع لنتائجك لو كانت البيانات ماخوذة من محطة داخل مركز مدينة حضرية؟

الجواب:-----

.---

س5: أذكر اهم التفاعلات الكيميائية التي تنتج SO_2 ؟

الجواب:-----

.---